






ПРОТОКОЛ ЛІКУВАННЯ РАН - ТИМЕ КОНЦЕПТ (КЛАСИЧНИЙ)

ПОВЕРХНЕВІ РАНИ

ЧИСТА РАНА	СУХА (<u>гідратувати</u>)	ВОЛОГА (<u>абсорбувати</u>)	МОКРА (<u>абсорбувати</u>)	ФОТО
НЕКРОЗ – <i>ДЕБРИДУВАТИ</i> Перевязочна група – <i>Дебридуюча</i>	Медова мазь – Мелладерм плюс Коллоїдний гель Фламінал гідро	Медова мазь – Мелладерм плюс Коллоїдний гель Фламінал гідро	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка - Коллоїдний гель Фламінал форте	
ФІБРИНОЗНИЙ НАЛІТ – <i>ДЕБРИДУВАТИ</i> Перевязочна група – <i>Дебридуюча</i>	Медова мазь – Мелладерм плюс Коллоїдний гель Фламінал гідро	Медова мазь – Мелладерм плюс Коллоїдний гель Фламінал гідро	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка - Коллоїдний гель -Фламінал форте	
ГРАНУЛЯЦІЯ/ЕПІТЕЛІЗАЦІЯ – <i>ЗАХИСТ РАНИ</i> Перевязочна група – <i>Захист рани</i>	Медова сітка – Мелладерм тюле + Мелладерм мазь Коллоїдний гель Фламінал гідро	Медова сітка – Мелладерм тюле + Мелладерм мазь Коллоїдний гель Фламінал гідро	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка - Коллоїдний гель - Фламінал форте	
КОНТАКТ З КІСТКОЮ:	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	

КРИТИЧНА КОЛОНІЗАЦІЯ, ІНФЕКЦІЯ	СУХА (<u>гідратувати</u>)	ВОЛОГА (<u>абсорбувати</u>)	МОКРА (<u>абсорбувати</u>)	ФОТО
НЕКРОЗ – <i>ДЕБРИДУВАТИ</i> Перевязочна група – <i>Дебридуюча</i> Перевязочна група – <i>Антисептична</i>	Медова мазь - Мелладерм плюс Коллоїдний гель Фламінал гідро + + Антисептична Раностоп 10% мазь – 4/1	Медова мазь - Мелладерм плюс Коллоїдний гель Фламінал гідро + + Антисептична Раностоп 10% мазь – 4/1	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка – Коллоїдний гель- Фламінал форте + +Антисептична Раностоп 10% мазь – 4/1	
ФІБРИНОЗНИЙ НАЛІТ – <i>ДЕБРИДУВАТИ</i> Перевязочна група – <i>Дебридуюча</i> Перевязочна група – <i>Антисептична</i>	Медова мазь - Мелладерм плюс Коллоїдний гель Фламінал гідро + + Антисептична Раностоп 10% мазь – 4/1	Медова мазь - Мелладерм плюс Коллоїдний гель Фламінал гідро + + Антисептична Раностоп 10% мазь – 4/1	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка – Коллоїдний гель- Фламінал форте + Раностоп 10% 4/1	
ГРАНУЛЯЦІЯ/ЕПІТЕЛІЗАЦІЯ – <i>ЗАХИСТ РАНИ</i> Перевязочна група – <i>Захист рани</i> Перевязочна група – <i>Антисептична</i>	Медова сітка + Мелладерм тюле Медова мазь - + Мелладерм Коллоїдний гель Фламінал гідро + + Антисептична Раностоп 10% мазь - 4/1	Антисептична Бетадин мазь мазь - Коллоїдний гель –Фламінал гідро Медова сітка + Мелладерм тюле Медова мазь - + Мелладерм	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка – Коллоїдний гель -Фламінал форте + Раностоп 10%	
КОНТАКТ З КІСТКОЮ:	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	

Принципи лікування: Некроз, Фібринозний Наліт – Дебридувати (*механічно, аутолітично, осмотично, ензиматично, хірургічно, біохірургічно*).


Баланс Вологості – забезпечити вологе середовище. *Суха - гідратуємо, Волога – зберігаємо, Мокра – абсорбуємо.*




Грануляція, Епителизація – захист горануляційної тканини.

Краї рани – захист здорової шкіри від надмірної вологості, травми, інфекції, переохолодження.

WONDZORGSCHEMA - TIME CONCEPT (KLASSIEK)

ГЛИБОКІ РАНИ

ЧИСТА РАНА	СУХА (<i>зідратувати</i>)	ВОЛОГА (<i>абсорбувати</i>)	МОКРА (<i>абсорбувати</i>)	ФОТО
НЕКРОЗ – <i>ДЕБРИДУВАТИ</i>	Медова мазь – Мелладерм плюс	Медова мазь – Мелладерм плюс	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка -	
Перевязочна група – <i>Дебридуюча</i>	Коллоїдний гель Фламінал гідро	Коллоїдний гель Фламінал гідро	Коллоїдний гель -Фламінал форте	
ФІБРИНОЗНИЙ НАЛІТ – ДЕБРИДУВАТИ	Медова мазь – Мелладерм плюс	Коллоїдний гель -Фламінал гідро	Коллоїдний гель -Фламінал форте	
Перевязочна група – <i>Дебридуюча</i>	Коллоїдний гель Фламінал гідро	Медова мазь - Мелладерм плюс	Поліуретанова - SanoSkin - Foam губка -	
ГРАНУЛЯЦІЯ/ЕПІТЕЛІЗАЦІЯ – ЗАХИСТ РАНИ	Медова сітка + Мелладерм тюле Медова мазь Мелладерм мазь	Медова сітка + Мелладерм тюле Медова мазь Мелладерм мазь	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка -	
Перевязочна група – <i>Захист рани</i>	Коллоїдний гель Фламінал гідро	Коллоїдний гель Фламінал гідро	Коллоїдний гель -Фламінал форте	
Перевязочна група – <i>Напоанювачі ран</i>				
КОНТАКТ З КІСТКОЮ:	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	

КРИТИЧНА КОЛОНІЗАЦІЯ, ІНФЕКЦІЯ	СУХА (<i>зідратувати</i>)	ВОЛОГА (<i>абсорбувати</i>)	МОКРА (<i>абсорбувати</i>)	ФОТО
НЕКРОЗ – <i>ДЕБРИДУВАТИ</i>	Медова мазь - Мелладерм плюс	Медова мазь - Мелладерм плюс	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка –	
Перевязочна група – <i>Дебридуюча</i>	Коллоїдний гель Фламінал гідро + + Антисептична Раностоп 10% мазь 4/1	Коллоїдний гель Фламінал гідро + + Антисептична Раностоп 10% мазь 4/1	Коллоїдний гель Фламінал форте + Антисептична Раностоп 10% мазь -	
Перевязочна група – <i>Антисептична</i>				
ФІБРИНОЗНИЙ НАЛІТ – ДЕБРИДУВАТИ	Медова мазь - Мелладерм плюс	Медова мазь - Мелладерм плюс	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка –	
Перевязочна група – <i>Дебридуюча</i>	Коллоїдний гель Фламінал гідро + + Антисептична Раностоп 10% мазь 4/1	Коллоїдний гель Фламінал гідро + + Антисептична Раностоп 10% мазь 4/1	Коллоїдний гель Фламінал форте + Антисептична Раностоп 10% мазь -	
Перевязочна група – <i>Антисептична</i>				
ГРАНУЛЯЦІЯ/ЕПІТЕЛІЗАЦІЯ – ЗАХИСТ РАНИ	Медова сітка Мелладерм тюле + Медова мазь - +Мелладерм мазь	Медова сітка Мелладерм тюле + Медова мазь - +Мелладерм мазь	Поліуретанова SanoSkin - Foam губка –	
Перевязочна група – <i>Захист рани</i>	Антисептична Раностоп 10% мазь -	Антисептична Раностоп 10% мазь -	Коллоїдний гель Фламінал форте + Антисептична Раностоп 10% мазь -	
Перевязочна група – <i>Антисептична</i>				
Перевязочна група – <i>Наповнювачі ран</i>				
КОНТАКТ З КІСТКОЮ:	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ	

Принципи лікування: Інфекцію – попередити, контролювати. **ПРОМИВАТИ РАНУ ОБОВ'ЯЗКОВО**, ОБЕЗЗАРАЖУВАТИ ТІЛЬКИ ПО ПОКАЗАХ.

Зстосування антисептиків (критична колонізація, інфекція, понижений імунітет), після взяття мазка.

АВ застосовувати тільки системно (IV, Per Os), згідно антибіотикограми. **Місьцеве застосування АНТИБІОТИКІВ ЗАБОРОНЕНО.**

Глибокі рани – наповнити. Контроль контакту з кісткою. **КОНТАКТ З КІСТКОЮ – НЕГАЙНО КОНТАКТУЙТЕ З ЛІКАРЕМ.**

Правильно призначений перевязочний матеріал може залишатись в рані до 7днів.